DIGNITY DENTAL PRACTICE
Family & Cosmetic Dentistry

Cuidados después de empastes (rellenos) y adhesión dental

La mayoría de los pacientes pueden volver a sus actividades normales inmediatamente después de un empaste o procedimiento de adhesión. Puede haber sensibilidad leve y temporal, especialmente después de una restauración profunda.

ESPERE A QUE PASE LA ANESTESIA	SENSIBILIDAD LEVE	PROTEJA LA ADHESIÓN
Evite morderse accidentalmente la mejilla, el labio o la lengua.	La sensibilidad al frío o a la presión puede ser temporal.	Evite hábitos que puedan astillar el material compuesto.

Después de un empaste

- Espere hasta que desaparezca el adormecimiento antes de masticar normalmente.
- Puede haber sensibilidad leve del diente o de la encía y normalmente mejora con el tiempo.
- Si el diente duele al morder o parece tocar primero, llámenos; el empaste puede necesitar un ajuste de mordida.
- Llámenos si presenta dolor intenso o que empeora, hinchazón, fiebre o sensibilidad intensa y prolongada al frío o al calor.

Después de adhesión cosmética

- Evite morderse las uñas, bolígrafos, hielo, caramelos duros o usar los dientes para abrir paquetes.
- Cepíllese dos veces al día con un cepillo suave y pasta con flúor, y use hilo dental diariamente.
- El material compuesto puede mancharse más que la porcelana. Limitar el tabaco y las bebidas oscuras frecuentes puede ayudar a mantener su apariencia.
- Llámenos si nota un borde filoso, una astilla, una superficie áspera o un cambio en su mordida.

Recuerde: La sensibilidad leve después de un tratamiento dental reciente suele disminuir; el dolor debe mejorar, no hacerse más intenso ni persistente.

¿Preguntas o inquietudes?
Llame a Dignity Dental Practice al (209) 957-1244.

1545 Saint Marks Plaza, Suite 1, Stockton, CA 95207 | **(209) 957-1244** | **www.dignitydentalpractice.com**